

Рекомендации Кобб по организации поения



Поилки слишком высоко, птица никогда не должна стоять на цыпочках, когда пьет. Потребление воды, в этом случае, снижается.



Поилки слишком низко, птица пьет наклонясь вперед и захватывает ниппель клювом сбоку. Это приводит к потерям воды и влажной подстилке.

Как использовать Кобб расходомер

- Поместите расходомер под ниппелем, действующей системы поения (в момент когда птица в птичнике пьет)

- Расходомер должен касаться ниппеля, чтобы поток воды лился свободно
- Используя секундомер, в течении 30 секунд наполняйте водой образец. Сделайте запись полученного количества воды в образце.
- Сравните полученное количество воды, с нормативом по расходу воды, составленному в соответствии с возрастом птицы:

возраст	Расход воды за 30 сек
0-7 дней	20 мл
7-14 дней	25 мл
14-21 дней	30 мл
21-28 дней	35 мл
28-35 дней	45 мл

Когда у пола есть уклон, регуляторы давления должны быть установлены на каждые 10 см падения уклона, чтобы позволить потоку воды двигаться вниз по линии/птичнику.

- Более высокое гидравлическое давление не означает более высокое потребление
- Слишком низкое давление может уменьшить потребление на целых 20%
- Если давление слишком низко, птице требуется больше времени, чтобы получить требуемое ей количество воды, но обычно птица тратит одинаковое количество времени на потребление воды, высок ли объем или низок при этом (менее чем 1 минуту)
- Уменьшение потребления воды → уменьшение потребления корма → уменьшение привесов птицы